

~~no. 40.~~

no. 40.

Precis d'observations Sur l'usage de la compression et des contr-ouvertures dans le traitement des absces et des ulceres caverneux.

Par M. Thomassin

Les cancri exigent la contr-ouverture ou la compression sont très frequents dans la pratique chirurgicale, mais l'emploi qu'en a fait jusqu'à present le commun des chirurgiens a été assez constamment soumis à la routine: la compression comme un moyen plus doux que la contr-ouverture est d'abord mise en usage, et l'on revient ensuite à celle-ci si la premiere est insuffisante. Tout usage est abusif des qu'il n'est pas raisonné et l'empirisme n'est propre qu'à mettre des entraves au génie et à repousser les bornes de nos connoissances.

Les observations quand elles ne sont pas rapprochées, comparées les unes avec les autres, et développées par les reflexions de l'observateur, sont au p. peu utiles aux progrès de l'art, que ^{qui lui sert de base} ce trésor entre les mains d'un avare l'est au bien general. Le génie et l'observation sont les createurs de l'experience, on erre en voulant les separer; l'un egare dans des especulations chimériques et l'autre retient dans une routine torpille et dormie.

La cure generale des tumeurs suppurees consiste dans l'exercice du pus et la consolidation de l'ulcere. Ou la tumeur borne seule, ou elle est ouverte par le chirurgien; dans l'un et l'autre cas si l'ouverture suffit pour procurer, d'une maniere facile et sure l'exercice de tout le pus contenu dans la tumeur, et de celui qui est exprimé de ses parois pendant la detersion de l'ulcere, le chirurgien n'a autre chose à faire qu'à entretenir l'ouverture suffisamment grande et à favoriser l'écoulement jusqu'à l'entiere consolidation du foyer. mais si la matiere n'a pas une issue libre, qu'elle s'écoupe dans des cavernes ou allongemens sinusoïdes, ce trouppement ne provenant point de l'étroitesse de l'ouverture le chirurgien doit procurer l'exercice, soit par une compression methodique qui la dirige continuellement vers l'ouverture à mesure qu'elle est exprimée du t. de la partie, soit par une ouverture nouvelle faite sur l'endroit même où le pus est retenu. Mais au quel de ces deux moyens le chirurgien donnera-t-il la preference? tentera-t-il le plus doux aux risques d'allonger la cure ou d'augmenter le mal pour en venir ensuite au plus actif? ou emploiera-t-il d'abord celui-ci, l'autre ayant pu suffire? On perd du tems à employer des secours inutiles, et c'est toujours un très-grand mal pour le malade, ces secours n'empêchent-ils d'autre inconvénient que leur inutilité, ou, on le tourmente inutilement, ce qui est un plus grand mal encore ou



ARC 45
no 120

2

mettant au usage des moyens violents que de plus doux eussent efficacement remplacés. Mon but dans cet épai est donc, d'examiner les cas où la compression peut et doit suffire à l'évacuation et à la consolidation des abcès ou des ulcères caverneux, et ceux où l'on doit d'abord recourir à la contre-ouverture sans employer la compression, ce moyen ne pouvant être qu'inutile ou nuisible.

Comme on ne peut guère prescrire l'usage d'un remède sans en connaître les effets, je vais débiter quelques réflexions sur la manière d'agir de la compression et des contre-ouvertures, pour servir d'introduction à la connaissance de leur usage.

La compression diminue l'espace du foyer comprimé, et dont on a intention de procurer par son moyen la réunion; elle affaïpe ou diminue le calibre des vaisseaux et gêne la circulation des liqueurs; elle fatigue et irrite la peau sur laquelle elle est appuyée. De cette triple action immédiate et primitive de la compression découlent tous les effets qu'on en attend et tous ceux qu'on peut en craindre.

par la diminution du foyer et le rapprochement de ses parois la compression oblige la matière purulente qui y est retenue à s'écouler par son orifice, et met ces mêmes parois en contact et à portée de se réunir, dès que par la détersion du sac elles auront les qualités requises, et que l'abondance du pus n'opposera plus obstacle à leur recollément. C'est tout le avantage que le chirurgien se propose de la compression méthodique, pour la cure des ulcères et foyers caverneux; et rien ne seroit plus avantageux en effet que ce moyen, s'il produisoit toujours cet effet comme il semble que cela seroit être, étant purement mécanique et paroissant devoir produire des effets déterminés. Suivons en la progression avant qu'il rien prononcet.

1^o quand le sinus qui communique du foyer comprimé avec l'orifice de l'ulcère est étroit, tortueux, on obtient par un quelque point de contact, et qu'il ne dégorge pas librement, la matière comprimée agissant de tous côtés à la manière des liquides, se glisse dans le tissu des parties et porte dans leurs substance un engorgement qui s'étend aux abcès collatéraux, à des clapiers de.

2^o la compression diminue le calibre des vaisseaux médiocres, affaïpe totalement ceux qui sont plus petits et par là gêne considérablement la circulation, tant dans le centre de l'endroit comprimé que dans le voisinage, ce qui cause un engorgement sensible qui n'est quelquefois qu'une espèce de dougissure, et qui fait toujours plus ou moins d'obstacle à l'épuisement et au recollément du foyer purulant.

3^o l'irritation que l'appareil compressif fait à la peau, surtout lorsqu'elle a peu d'épaisseur, et qu'elle est amincie par le pus, y attire quelquefois une inflammation qui oblige à abandonner ce moyen pour recourir à la contre-ouverture. quelquefois l'inflammation fait ce que le chirurgien auroit dû faire, elle ouvre la peau et procure une ouverture naturelle.

Sans cette énumération générale des avantages et des inconvénients de la compression je n'ai entendu parler que de celle qui est faite avec méthode et à bon escient, et dans les cas où elle est réellement indiquée; car lorsqu'elle est mal faite elle peut devenir la source des accidents les plus graves, dans les circonstances même où elle aurait pu être la plus avantageuse.

Pour être bien faite, la compression doit 1^o être assez légère pour ne faire que diminuer la visité du sac dont on veut expliquer la matière, sans que les parois se tendent d'abord, pour ensuite être augmentée par gradation jusqu'à son entier affaiblissement. 2^o Elle doit être égale, portant autant sur les circonférences du foyer que sur son centre. 3^o Elle doit s'étendre toujours un peu au-delà des limites du foyer, sur les parties environnantes, pour repérer plus efficacement la visité et pour moins fatiguer le patient. 4^o Elle doit être faite de manière à diriger perpétuellement la matière vers l'orifice de l'ulcère ou de l'abcès, en laissant toujours parfaitement libre le trajet qui doit la conduire. (b) ou lit dans les

(a) Beaucoup de chirurgiens se contentent d'une manière toute opposée et voyent autre parfaitement dans le sens de la nature en enfonçant le plancher du foyer dans la cavité, par un tampon moule, pour ainsi dire, sur la forme de cette cavité; il en résulte que le pus est obligé de couler vers la circonférence du foyer et quelque fois de refluer dans la substance des parties.

(b) Guy de Chauliac est celui d'entre les auteurs les plus qui il faut suivre pour mettre en exécution ses préceptes.

des auteurs que je connais qui il est assez rare que la compression seule satisfasse à toutes nos espérances; nous sommes souvent obligés pour aider son effet d'y joindre les injections, pour délayer la matière et en appliquer l'appareil compréssif, faciliter l'écoulement; cependant ce moyen auxiliaire en apparence si doux et si analogue aux règles qu'il donne à l'état du mal n'est pas exempt d'inconvénients, après graves pour suggérer les chirurgiens annoncent la pratique et à ne l'employer dans le traitement des abcès et des ulcères casernes que dans des circonstances indispensables et avec circonspection. Mon expérience me démontre que ce n'est pas à tort que M. Grillon en a beaucoup restreint l'usage relativement aux maladies qui font le sujet de son traité, dans les commentes de M. de Vries (c)

dit le § 415 de Döerhaase.

(c) Mém. sur les injections.

qui a remporté le prix de la Acad. de Chir. en 1758.

(d) Remarques sur les fistules.

tom. IV de la traduction des aphor. de Chir. de Döerhaase et de son comment.

de Vries-victor. pag. 577.

« Par la contre-ouverture, dit M. Louis, on met directement à découvert le foyer de l'abcès, on en débarrasse la cavité, et le pus opposé s'écoule par les seules forces de la nature de la cavité. » (d) La contre-ouverture procure sur le champ une issue libre et immédiate à la matière purulente; après l'évacuation des parois du sac se déchargent et se recollent comme cela arrive après l'ouverture d'un abcès. La contre-ouverture satisfait en même temps à toutes les indications, lorsque la substance des parties, couverte après le report pour opérer la rapprochement des parois du sac à proportion qu'elles englobent la matière dont elles sont aboussées. Si au contraire les parties sont dévotées considérablement et qu'elles conservent peu de report, une compression légère et méthodique doit concourir avec la contre-ouverture à réparer le désordre. C'est dans ce cas que la visité devient aussi d'un grand secours pour favoriser une suppuration saine, ne pas faire pour dégorger les parties aboussées. La contre-ouverture découvre le fond du mal, permet à l'œil et au doigt du chirurgien d'inspecter tous les reins et de découvrir toutes les dispositions vicieuses qui peuvent faire obstacle à la guérison, telles que la carie, les corps étrangers de



4

On voit par les reflexions qui precedent que l'usage de la compression dans le traitement des ulcres cancereux doit être bon à un bien petit nombre de cas ; que jusqu'il est à peu rare que ces sortes d'ulcres se trouvent avoir les dispositions favorables à l'emploi de ce moyen, qui ne peut être efficace que lors que le sac est peu considérable par son étendue, et peu dirigé de l'origine de l'ulcère ; que quand la voie de communication est bien ouverte et bien libre sans tortuosité ni cliques, et que les parois du sac ne sont pas détachées et abrévées, au point d'avoir besoin d'une longue suppuration pour se réunir et se consolider. Tous les ulcres de ce genre qui manqueraient de ces dispositions favorables ou qui seraient précisément dans les circonstances contraires, ne seraient pas dans le cas d'être consolidés par le secours de la compression : il n'y a qu'une circonstance qui fasse exception à la règle générale, c'est lorsqu'on ne pourra pas employer la contre-ouverture sans danger ou sans de grands inconvénients, soit à cause de la profondeur du foyer cancereux, soit à cause de la situation sous des parties qu'il faut respecter et dont la lésion peut être suivie d'accidents plus graves que la maladie qu'on veut guérir, ou que ceux que la compression peut occasionner. C'est ce qui se rencontre fort rarement dans les quatuorze, aujourd'hui surtout que les progrès de l'art ont fait voir qu'il est peu de parties à travers desquelles une main adroite et exercée ne puisse pénétrer. Il parait cependant que ce n'est que dans cette circonstance que les anciens recommandent la compression ; que de Chauliac d'après Galien recommande le bandage expulsif pour réunir les ulcres cancereux lorsqu'on n'a pas pu insérer l'ulcère dans la saignée et dans son fond, ou même dans toute sa profondeur.

Ces reflexions sont le résultat d'un assez bon nombre d'observations dont je rapporterai les principales.

En 1770 une fille de dix ans à vingt ans ayant une tumeur phlegmoneuse considérable à la partie antérieure et interne du genouil me fit venir de la voir. La tumeur étant en suppuration, j'en fis l'ouverture dans son centre et selon les règles de l'art, le foyer se détacha bien tôt et la consolidation avançoit lorsqu'il se forma un nouveau foyer à deux pouces et demi outre trois pouces plus haut que le condyle interne du fémur, vers le bord interne et proche la ^{disposition} queue d'étrépeur comme on le verra de la coupe interne, ce sac devoit en partie dans l'ulcère qui sortoit de l'ouverture du premier foyer, mais un sinus assez étroit et qui se gorgeoit mal comme le trajet de ce sinus n'étoit pas considérable je me qu'en l'élargissant avec un dilatant je pourrais au moyen d'un bandage expulsif procurer la vacuation du sac et ensuite sa réunion. Je ne me trouvais pas, mais je ne pus pas d'abord. Je portai dans le sinus une mèche ou espèce de bougie d'éponge préparée, qui fit s'écouler ce que je desirois et procura le dégorgeement complet du sac ; mais le sinus se reforma bientôt de nouveau ; alors j'y plaçai un petit cilindre de trontingue de minium, qui fit une écarce dont la chute procura une issue suffisante à la

5
matière. Je parviens à consolider le sac au moyen de la compression dans
l'espace de quinze jours, et la cicatrisation de l'ulcère provenant du premier foyer ne
tarda pas à compléter la guérison. il est presque hors de doute que l'appareil expansif
n'eût pas réussi dans ce cas si je n'eusse corrigé la mauvaise disposition de l'ulcère (étroitesse
du sinus) qui pourroit rendre ces secours inutile ou même pernicieux.

il paroit résulter de cette observation que si le sinus est trop étroit pour permettre au pus de
s'écouler librement, la compression doit être instructive et nuisible, et que pour la rendre
efficace il faut procurer à la matière une issue libre et d'un calibre suffisant; ainsi
toutes les fois que le sinus ou orifice du foyer ne pourra qu'être dilaté ou agrandi, soit
à cause de sa longueur ou de sa tortuosité, l'on ne peut ni on ne doit tenter la compression,
il faut recourir indispensablement à la contre-ouverture.

On n'emploieroit qu'à peu rarement le dernier moyen s'il n'y avoit quelque étroitesse de l'orifice
des ulcères carieux qui étoit un obstacle à la sortie du pus de la compression; mais on la
voit être inutile et devenir même nuisible dans des occasions où le pus peut s'écouler et
s'écoule effectivement avec beaucoup de liberté, telle que dans les circonstances suivantes.

- 1^o lorsque le foyer est spacieux et fort étendu, 2^o qu'il y a beaucoup de vers et le
tissue des parties, et qu'elles en sont abouées, 3^o qu'il a dilaté et aminci les téguments.
- 4^o que le foyer est lui-même carieux, partagé en plusieurs cavités, et fourni de la paille.
- 5^o que le pus est de mauvaise qualité, 6^o qu'il y a lieu de soupçonner un corps
étranger ou de la carie aux os, 7^o que le sac est situé plus bas que l'orifice par où
il doit s'écouler, 8^o qu'il a son siège dans des parties dont la mole et la laxité, ou la
disposition ne peuvent pas présenter un point d'appui suffisant à la compression.
- 9^o enfin lorsque le foyer est recouvert par des parties dures qui ne seroient être
comprimées. Je vais ^{faire valoir} justifier ce que j'avance par le fait et par le raisonnement.

I.

Quand le foyer carieux est considérable il y a toujours plus ou moins de délabrement
dans les parties qui en sont le siège, le pus les a infiltrées et il faut une suppuration
proportionnée au désordre pour remettre les parties dans leur première intégrité. il
n'est pas douteux que la compression réussiroit mal dans ce cas; fort souvent on est
obligé de multiplier les contre-ouvertures, tant pour procurer au pus des issues plus libres
et moins éloignées, que pour faciliter la suppuration des parties du foyer et y porter
avec plus de facilité les médicaments nécessaires. l'observation de ces préceptes est de la
plus grande importance et des praticiens distingués ont eu quelque fois beaucoup de
rapport de les avoir négligés. l'histoire fournit une observation remarquable qui
prouve le danger au quel on expose un malade en négligeant de faire les contre-ouvertures
nécessaires dans les abcès dont le foyer a beaucoup d'étendue. Un homme avoit



un abcès qui s'étendait depuis le plexe de la femme jusqu'à la matricule interne, et
 qui étoit très-rempli de matière dans toute son étendue. « Je crus, dit la malade,
 » qu'en ouvrant cette grande dilataction des téguments sous lesquels elle étoit contenue,
 » en leur partie supérieure, vers la circonférence des muscles fessiers, & proche la
 » matricule, je venais dire à ses deux extrémités, que le milieu se pourroit consolider, comme
 » il m'est souvent arrivé en d'autre rencontre, sans continuer les progrès de l'ouverture d'une
 » extrémité à l'autre. il sortit plus de huit ^{onze} livres de pus par ces deux ouvertures, dont
 » le malade se trouva très-soulagé pendant sept à huit jours, après lesquels et lorsque
 » je voyois que les chairs approchoient de leur fin, les douleurs renaissent de nouveau plus
 » vives qu'auparavant à l'endroit que j'avois ménagé sans le vouloir ouvrir; ce qui
 » m'engagea (après avoir temporisé pendant plusieurs jours, et avois vu les douleurs
 » augmenter sans cesse,) d'ouvrir ce que j'avois épargné jus qu'alors, après quoi le malade
 » se trouva sans douleur, mais se vit à garder le lit longtemps, (plus d'un an) pendant
 » que cette terrible ~~pluie~~ ouverture fut à s'inciser et à se cicatriser, quelque bien que
 » je pris pour en avancer la guérison. » (C)

(C) diss. compl. tom. 1.
 pag. 147 et suivantes.

Je ne puis mieux apprécier cette observation de la malade que par un passage de M. Boiss.
 art. contre-ouverture de l'encéphalopédie. « On tire beaucoup de fruit de l'usage des contre-ouvertures
 » dans le grand abcès. au moyen des incisions glaciées convenablement adifférens points
 » de la tumeur, on ménage la peau, on découvre mieux les parties; les suppurations
 » sont mieux abondantes, et le curement de moindre durée et plus facile à obtenir;
 » chaque livre de division fournissant des points d'appui à la formation d'une petite cicatrice.
 » Deux avantages sont démontrés et l'expérience journalière fait voir la difficulté et
 » le temps qu'il faut pour repaser une grande partie de l'abscès. » il résulte de ces
 » règles dictées par l'expérience et la réflexion que la conduite de la tumeur seroit aujourd'hui
 » fort répréhensible. la longueur de la cure ne doit sa cause qu'à la méthode
 » inflammatoire et peu raisonnée qu'il employoit.

II.

Lorsque le pus a beaucoup dilaté le plexe de la partie qu'elle en est abscérée
 il faut une longue suppuration pour procurer le dégorgeement des foyers, quand même
 il seroit peu considérable, et la compression d'un cancer ne sùffit pour empêcher
 jamais; tout étoit et ce parce que ce moyen en enlevant la plus grande partie du
 pus abondant que fournit le foyer il en retient toujours une portion plus ou moins
 grande qui croît dans les cellules, dont cette sorte de foyer est environné, et ^{qui} abaisse
 de plus en plus la substance de la partie, favorise la formation de nouvelle proles
 de l'extinction de l'ancienne. Voilà ce qu'on observe presque toujours dans le dépôt qui
 sont la suite des longues douleurs de Rhumatismes, lorsqu'on veut, après qu'il s'est
 ouvert faciliter le recouvrement de leur parois au moyen de la compression, ce qui

7
d'abcès ont toujours une certaine étendue, leur paroi ^{est} toujours plus ou moins adhérente,
et leur cavité n'est presque jamais bien régulière, il y a des poches ou abougements
qui exigent un traitement particulier.

Une pauvre femme après avoir porté pendant plus d'un an une douleur de
Rhumatisme des plus fortes, qui s'étendait à toute la partie antérieure de la cuisse droite
et aux lombes, s'appresenta enfin dans le courant de l'été dernier qu'il s'était formée
une tumeur qui couvrait toute la face antérieure de la cuisse depuis la grande
trochanter jusqu'à los Sacrum. cette tumeur était plus de trois mois arrivée
à suppuration. j'en fis l'ouverture à la partie la plus déclive, je détruisis avec mon
doigt toutes les brides que j'y atteindrais et je guaisai la plaie et la cavité de
l'abcès selon la méthode ordinaire. quelque jours après voyant que la disette
postérieure du foyer, qui avoisinait los Sacrum fournissait beaucoup de pus lorsque
je le comprimais avec la main, je crus devoir y appliquer un appareil expulsif.
j'employai ce moyen pendant plus de quinze jours; la partie antérieure du foyer se
détachait, l'ouverture devenait de jour à autre plus étroite, tandis qu'il se faisait une
drouffion dans le voisinage de l'endroit comprimé qui augmentait tous les jours un peu,
et l'ulcère fournissait toujours abondamment. je recourus aux injections détersives
que j'employai encore pendant huit jours sans succès. alors je pensai que l'ulcère
allait devenir fistuleux par le défaut de défection du fond, et je me déterminai à faire
une contre-ouverture, qui procura la guérison au bout d'un mois; ce que j'aurais
très sûrement obtenu en continuant la compression. la drouffion qui était
survenue après quelques jours d'usage de ce moyen annonçait la perte du rapport des
parties voisines à mesure qu'elles s'absorbaient davantage et la gêne de la circulation
dans les vaisseaux capillaires de la peau. j'ai suivie à peu près la même ^{méthode} dans
le traitement d'un abcès considérable qui survint à l'épaule d'une autre femme
encore à la suite d'une longue douleur Rhumatismale, et qui fut aussi fort bruyante
à se former. toute l'épaule était très enflée, on sentait une fluctuation profonde
dans toute son étendue depuis l'endroit de l'articulation de l'humérus jusqu'à la
partie supérieure du bras et l'inférieure du cou. j'ouvris et abcès immédiatement
au dessus de l'articulation. le foyer était depuis la portion du deltoïde qui s'étend
à cet endroit et se continuait sous celle du trapèze qui est continue, tout le long
de la forme triangulaire de l'omoplate jusque près que aux vertèbres. je n'ouvris
pas, comme on le pense bien, le foyer dans toute sa longueur, j'aurais été agité
contre toutes les règles, je me bornai à une ouverture suffisante pour bien dégager
ce foyer; elle avait environ trois pouces de longueur. je n'aurais point de confiance à
la compression dans cette circonstance, mais la résistance de la malade à s'opposer
à une seconde ouverture dans la partie postérieure du foyer m'obligea à employer



++ au lieu postérieurement

(F) une remarque se présente
ici naturellement, que je ne dois
pas laisser échapper: lorsqu'on
emploie la compression, la voie
de communication du foyer
perforant avec l'orifice de
l'ulcère ne s'empêche que lorsque
le foyer est entièrement guéri
qu'il s'est toujours de guérison
aupres qui au contraire, tend à
qu'au contraire quand on a eu
recours à la contre-ouverture, c'est
dans ce trajet qu'on observe
toujours la consolidation, et il est
bien toujours certain, ^{consolidé} avant
de le foyers au quel il survient en recourant
d'abord à la contre-ouverture, sans employer la compression qui étoit
d'usage. cette remarque justifie
donc toutes les opinions que j'ai
un peu jugé bien favorable
pour la contre-ouverture, en effet
le foyer comprimé peut se
détacher et se recoller, mais après
tout cet ouvrage il peut se
former de nouvelles carteries dans
le trajet dont je parle, ce qui ne
peut pas avoir lieu dans le cas
où l'on s'est servi de la contre-
ouverture, ce trajet étoit réuni
bien avant le foyer, qui n'est
plus alors qu'un ulcère simple
qui ne s'agrand pas vers la
guérison.

(g) mémoire de M. Norris
sur les fistules, pris de l'académie
Royale de Médecine tome 4.



Supprimerait encore quelque temps ce qui pourroit venir de l'état d'infiltration de la jambe,
mais elle se cicatrisesoit solidement. il se forma un autre foyer perforant à la
face interne de la jambe que j'ouvris, un petit trajet situé près du jarret trois
pouces plus haut que celui cy se déchargeoit dans la cavité d'une manière assez
libre; je crus cette fois pourroit mettre en usage le bandage élastique, et
en droit ne parviroient pas à se faire peu à l'atonie du reste de la jambe. je
l'employai pendant plus de quinze jours sans ~~aucun~~ aucun changement, au bout du
quel temps la peau qui recouroit ce foyer s'enflamma, ce qui m'obligea d'abandonner
la compression pour recourir à la contre-ouverture. l'inflammation se dissipée près
qu'auprès tout le sinus fut bientôt consolidé et le recouvrement du foyer se fit peu de
jours après. (F)

il est hors de doute, que dans les trois observations précédentes j'aurois hâté la guérison
avant le foyer au quel il survient en recourant d'abord à la contre-ouverture, sans employer la compression qui étoit
d'usage. cette remarque justifie
donc toutes les opinions que j'ai
un peu jugé bien favorable
pour la contre-ouverture, en effet
le foyer comprimé peut se
détacher et se recoller, mais après
tout cet ouvrage il peut se
former de nouvelles carteries dans
le trajet dont je parle, ce qui ne
peut pas avoir lieu dans le cas
où l'on s'est servi de la contre-
ouverture, ce trajet étoit réuni
bien avant le foyer, qui n'est
plus alors qu'un ulcère simple
qui ne s'agrand pas vers la
guérison.

III.

Lorsque le pus s'écoule et amène les séquestrations la compression est absolument
contre-indiquée, la peau trop sensible, trop irritée s'enflamme bientôt comme
on le vit dans la quatrième observation, et s'ouvre seule si l'on n'y a de secours
bientôt d'un fardeau qui l'opprime, c'est ce que j'ai vu arriver plusieurs fois et
notamment sur la femme qui fait le sujet de ma troisième observation. Environ
deux mois après l'acquisition de la cicatrice de la plaie provenant de la première
ouverture, près de l'articulation du bras avec l'épaule, se recouvrit par un très petit
sinus et donna issue à beaucoup de pus; cette matière venoit d'un petit abcès
qui s'étoit fait immédiatement sous la peau trois ponce plus bas, à la partie externe
moyenne supérieure du bras, et qui étoit venu à suppuration sous beaucoup de
douleur ni d'inflammation. Cette femme voyant que le pus s'écouloit par l'ancienne
plaie qui s'étoit ouverte, se contentoit de faire vider la tumeur en la pressant avec
l'ongle, et faisoit appliquer par son mari une compresse en plusieurs doubles, avec
une bande tant pour comprimer ^{les} tumeurs qu'pour tenir en place une emplâtre
qu'elle mettoit sur l'orifice du sinus; car cette femme ayant entendu parler de la
compression lors de son premier trajet, avoit bien compris ce qu'on devoit en espérer et
comment elle agissoit. après quelques jours de ces pansements la peau qui recouroit

encore, mais avec aussi peu de succès que chez la femme qui fait le sujet de
l'observation précédente, quoique j'ai pris toutes les précautions possibles pour la
diriger avantageusement et donné à la malade l'attitude la plus favorable à
l'écoulement du pus. il survint comme à la précédente de la touffure, avec un
écoulement abondant de matière épaisse et mal sentie. les injections loinde
procurent quelque avantage, semblent augmenter encore et au lieu. alors je fis
sortir fortement à la malade la nécessité de la contre-ouverture, à laquelle elle
consentit enfin, et qui donna issue à beaucoup de matières retenues derrière plusieurs
cloisons que je n'avois pu détruire lors de la première ouverture, et d'où elle ne
sortoit qu'imparfaitement par la compression. je pris une meche chargée de
digestif animé avec la poudre de mirro, de l'un à l'autre ouverture par le contre
du foyer. le fond de l'ouverture alors directement détaché bien tôt, je supprimai la
meche au bout de quinze jours et l'ulcère se consolida dans assez peu de temps.

En 1770 un pêcheur de trente cinq à quarante ans eut un érysipèle phlegmoneux à la
jambe droite, à la suite d'une contusion violente à cette partie au sujet de laquelle
il ne prit aucune précaution. l'inflammation s'étendit depuis le genou jusqu'au
cou de pied. l'endroit de la bleime qui étoit à la partie moyenne de la jambe, sur laquelle
fut attaquée d'une suppuration gangreneuse, et il se détacha plusieurs lambeaux qui
découvrirent le tégument cellulaire fort épais et une suppuration, qui étoit détachée de la peau et
des muscles dans une grande étendue. je pris une sonde cannelée sur la peau que
j'incisai d'environ cinq lignes de longueur. cette ouverture me servit à extraire tous les
lambeaux détachés du tégument cellulaire, et j'en tirai de considérable tout en longueur et
largeur qu'en épaisseur; mais c'est par ces circonstances que cette observation mérite
d'être consignée ici; toutes les incisions que cette suppuration destructive avoit laissées
se recollèrent assez promptement, mais il survint pendant le traitement plusieurs
degots consécutifs dont l'histoire doit être rapportée. la première s'ouvrit à la
partie supérieure interne de la jambe, j'en fis l'ouverture, il n'étoit pas considérable.
quelques jours après j'appercus qu'en pressant le long de la partie interne de la jambe au
dessus du foyer j'en faisois sortir beaucoup de pus, ce qui m'appara de l'existence d'un second
foyer ou du prolongement du premier. pour m'assurer positivement de l'état des choses, je
traversai légèrement la cavité du degot que j'avois ouvert et la pus ramener me
découvrit un nouveau foyer situé plus haut que le précédent, près de la terminaison
des muscles jumeaux et solaire qui communiquoit avec le premier par un sillon de
pres de huit lignes de longueur et qui se purgea assez bien; mais le tégument cellulaire voisin me
parut infiltré, il y avoit de l'œdème, accident qui me fit craindre que la longueur du tégument
ne parut être indiquer la compression, je fis une contre-ouverture, je pris une
meche dans le trajet de communication, que je ne laissai que peu de jours après les quel
à l'aide d'une légère compression il ne tarda pas à se consolider; les deux ouvertures

le sac s'enflamme et se perfora dans l'endroit le plus saillant de la tumeur, ce qui donna une issue plus libre et plus immédiate au pus, qui coula de lors en plus grande quantité. Cette femme vint ensuite pour une ouverture d'un ulcère, j'augmentai la petite ouverture et je lui conseillai de comprimer légèrement le trajet d'un doigt, qui fut guéri au bout de deux ou trois jours et le petit foyer fut entièrement consolidé avant la guérison. on a beaucoup abusé de tout le temps employé mal à propos à l'usage de la compression, en recourant au plutôt à la contre-ouverture et on éprouva bien des douleurs de la saignée au malade; c'est toujours la partie que prend un chirurgien instruit lorsqu'il apperçoit la mauvaise situation des téguments. Un homme avoit une abcs après une plaie à la cuisse; on fit l'ouverture à la partie supérieure extérieurement, à l'endroit où le pus auroit percé de lui-même les téguments, ce qui s'annonçoit par une petite tumeur enfoncée, rougeâtre dont la peau étoit usée et devenue mince par l'érosion intérieure. le pus avoit débouché les téguments vers la partie inférieure et interne du membre, à six travers de doigt plus bas que l'ouverture; les injections et les bandages empâtés ayant été sans effet, on fit une contre-ouverture à la partie la plus élevée du foyer, le bandage empâté fut enlevé et dirigé de haut en bas, et la cure n'eut aucune difficulté. (12)

(12) Remarques sur les fistules, par M. Louis. traduction de 4 ans vietin. Tom IV. pag 274.

IV.

La compression n'est pas plus indiquée lorsque le foyer est lui-même cavé, par exemple en plusieurs cellules ou voisin d'une de celles, parce que, comme il est facile de le sentir, il y a beaucoup de difficulté à bien faire la compression dans ces cas; il est impossible qu'elle agisse également sur toutes les cavités, à raison de la différence de leur grandeur de leur figure, de leur direction. Il y en auroit où la disposition des cloisons qui les séparent est un obstacle à l'écoulement du pus. il seroit très-avis de recourir à la contre-ouverture faite sur le principal foyer, pour en suite tenter la compression sur les autres foyers qui en ont des dépendances, à moins que par leur étendue et l'abondance de la matière, elles ne fassent exclusion à l'écoulement; dans ces cas on aura recours à une seconde contre-ouverture et même à une troisième s'il le faut. je ne serois cependant pas tout à fait d'accord avec M. Quérrey, qui voudroit qu'on fît autant de contre-ouvertures qu'il y a de ces vides cavés, quand on ne peut pas en faire une qui soit commune à tous. trait. de la supp. pag. 182. il me semble plus naturel de faire la première contre-ouverture sur le sac le plus considérable, le plus bas s'il est possible et vers lequel le pus des autres aura de la pente en ce qu'il y aient au fond, quelques communications; après cette ouverture si il y a quelque cloison membraneuse, des brides, et qu'elles soient à la portée du doigt, il sera facile au chirurgien de les détruire; si au contraire il ne peut pas saisir et qu'en comprimant les foyers latéraux, si je puis les appeler ainsi, ils serviroient librement dans celui qu'on a ouvert et qu'ils

(1)
get

11

ayant chacun en particulier les dispositions favorables dont il a été fait mention plus haut
(^{re} observation) l'appareil de plâtre suffira pour en procurer le recouvrement; mais si les
foyers sont considérables, si l'on ne peut pas lever entièrement les obstacles qui s'opposent
à l'écoulement du pus, on fera usage de recommander M. Guenay de contr'ouverture
jusqu'à ce qu'il s'en trouve une ou plusieurs qui puissent servir au dégorgeement de tout.

V.

Si le pus est d'une mauvaise qualité, qu'il soit sanieux, fétide, abondant,
noir, plombé, fétide &c. il est bon de dire que la compression sera plus
nuisible qu'utile. L'indication est de découvrir le fond du foyer, ou comme
le disent les anciens d'ouvrir l'ulcère dans sa racine, pour rechercher la cause de
la mauvaise disposition du pus, qui est toujours le mauvais état de l'ulcère; souvent
cet état dépend d'une grande quantité de tissu cellulaire aboussi et malsain qui doit tomber
avec la suppuration, et il est de toute importance qu'il soit découvert, tant pour
pouvoir porter dans le sac les médicaments capables de briser cet effet que pour
procurer au pus une libre issue; d'autre fois c'est un corps étranger, un os carié qui
est cause du mauvais état de l'ulcère, dans ces deux cas constants on doit parfaitement
que la contr'ouverture est de la nécessité la plus indispensable; cependant je vais entrer
dans quelque détail à ce sujet.

VI.

Si l'on arrive quelque fois qu'un ulcère se reforme solidement sur un
corps étranger, il faut savoir aussi que le plus souvent le corps étranger ^{est un obstacle} à sa réunion,
qu'ils se renouvellent souvent après bien de tentatives et qu'il survient des suppurations dont on
ne peut tarir la source que par la destruction du corps étranger qui en est la cause.
M. Petit rapporte à ce sujet une observation intéressante. Un enfant de dix ans
avait depuis six mois, à la région des lombes, un ulcère cancreux extrêmement
fétide, duquel il couloit tantôt plus tantôt moins de matière purulente, quelquefois
blanche & liée, mais presque toujours mêlée de matière noire et plombée. Cet
ulcère étoit la suite d'un abcès considérable qu'on lui avait ouvert en province. Après
quelques tentatives d'expectation que cet enfant guérirait par le seul secours des
pansements que lui faisoient ses parents, et après avoir consulté différentes personnes on
demanda M. Petit, qui fit sentir la nécessité d'ouvrir le fond de l'ulcère. Il incisa
auprès le fond de la cavité de la quelle il tira un gros tumeur de charpie en forme
de boudinnet que l'on avait oublié dans la plaie. Le jour même les accidents disparurent,
et l'ulcère reprit le chemin de la guérison qui fut prompt (1). Parmi un grand nombre
d'observations analogues à celle de M. Petit que je pourrais citer d'autres auteurs, j'en rapporte
à une de la même cause de la singularité. Une femme de la paroisse de Gournville
avait vu un sein qui lui avait abscédé, il y avait environ quinze années, en suite



(1) Œuvres posthumes de M.
Petit. tom. II pag. 43 et suiv.

(k) tome 1^{re} page 298.

» d'une vache, qui se querisoit et s'abrevoit de teues intus. En préparant à plain
» main tout le corps de cette mammelle abscedée, je fus surpris d'en voir sortir un
» corps étranger que je crus d'abord un amas de pus qui par un long séjour s'étoit
» endurci; mais étant venu à l'examiner, je trouvai que c'étoit un bourdonnet de
» charpie, dont le dessus étoit imbibé de pus, mais le dedans s'étoit composé de
» blanc comme s'il venoit d'y être introduit; ce qui me surprit fort, ainsi que
» plusieurs personnes qui le virent. Je conseillai à la femme de laver seulement le
» lieu avec du beau serice, sans y mettre autre chose & qu'elle se vint quérir
» sans retour, comme il arriva en fort peu de tems. » (k) Les os caries doivent être
» regardés comme des corps étrangers dans les ulcères; il est impossible de les reformer
» solidement avant l'extirpation de la portion altérée. il est aisé de sentir, sans que j'en
» dise davantage la nécessité de la contre-ouverture lors qu'on s'aperçoit que quel-
» qu'un des os par la soude traitée de la carie, et combien la compression pourroit
» devenir nuisible.

VII.

La situation du sac plus haut que l'orifice de l'ulcère, quoiqu'avantageuse ne
» garantit pas toujours le succès de la compression; mais lors que cette situation est dans
» un sens contraire on ne doit pas tenter ce moyen, cette disposition des parties
» est au sur garant de son inutilité. Les liquides serrent difficilement contre
» son propre poids dans des parties molles et spongieuses sans le fourrage; cependant
» on peut donner à la partie une situation qui mette le fond de l'ulcère plus haut que
» son orifice, on peut employer utilement la compression, pourvu toutefois, que l'ulcère
» soit disposé d'une manière favorable à l'emploi de ce moyen. j'ai vu, mais je ne
» puis me rappeler où, qu'un foyer pendant considérable formé au dessus du jarret
» s'est vuide par une ouverture faite vers le haut de la cuisse proche la fesse, et que
» les parties s'en sont recollées au moyen d'une compression méthodique et de la situation
» du jarret sur un oreiller, pour donner plus d'aperte à la matière vers l'orifice de
» l'ulcère. Cependant on doit remarquer que cette pratique a été plus heureuse
» qu'il n'est; la grandeur du foyer et la longueur du chemin que le pus avoit à
» parcourir ^{formoit} ~~formoit~~ ^{très} sûrement une contre-indication à l'emploi du bandage
» expulsif, ce qui fait voir qu'on ne peut quelque fois en heurtant les principes de l'art
» les plus solidement établis. Je ne dis pas que la compression ne réussisse jamais
» dans les cas où j'ai vu servir l'exclus de traitement des ulcères cancerreux, mais je puis
» assurer d'après l'expérience qu'elle sera le plus souvent inutile ou nuisible, et que quand
» elle réussira la douleur avec laquelle elle agit, les précautions auxquelles elle a sujet
» et les douleurs qu'elle cause quelque fois, la rendront toujours inférieur à la contre-
» ouverture.

VIII.

Si les foyers cancerreux à son siège dans des parties dont la mollesse, la laxité ou la
» disposition ne peuvent pas offrir à la compression un point d'appui suffisant pour en

après l'efficacité on ne doit pas mettre ce moyen en usage quand même l'ulcère
auroit d'ailleurs toutes les dispositions favorables pour le faire respirer. Tels sont les cas où
l'ulcère se trouve dans des parties remplies de beaucoup de graisse, comme les environs
de l'aune, le pli de l'aune, l'aisselle; les parties qui ne sont appuyées sur aucun
corps solide, comme la partie antérieure du ventre de. Heister parle d'un homme
de condition qui avoit un abcès fort considérable à la partie antérieure du ventre, dont
l'apex étoit près de l'ombilic et le fond à l'aune; dans ce cas tout étoit indigne de compression,
la grandeur du foyer, la situation de son fond dans des graisses qui devoient nécessairement
tomber en suppuration, et celle du reste de son étendue selon la partie antérieure du
ventre, en étoit trop mol pour pouvoir être comprimée efficacement; aussi Heister
ne s'y trouva point, il fit une contre-ouverture; mais il ne dit quel en a été le succès.

En 1774 il survint à une femme grosse de six mois un abcès à la partie postérieure
et un peu interne de la cuisse, positivement dans le pli de la fesse; après l'ouverture
de cet abcès je remarquai qu'en comprimant les environs de l'aune, il en sortoit un
pus fort abondant au reste de bonne qualité et je recommençai avec la onde un foyer
dans les graisses de cette partie; je fis ensuite une contre-ouverture suffisante qui
procure le dégorgeement des graisses, et le tout fut consolidé avant le mois revêlé.

aurait-il été prudent d'entreprendre la cure de ce dépôt au moyen de la compression?

Dans les dépôts cancerreux des mammelles, la compression ne réussit qu'exceptionnellement
(il seroit même très-dangereux de la jamais employer) tandis que les contre-ouvertures procurent
toujours la réunion en peu de temps; je parle ici d'après un bon nombre d'observations.
je préfère de faire à cette partie deux ouvertures médiocres plutôt qu'une grande qui est
toujours longue à se consolider.

IX.

Quand le foyer cancerreux est placé dans des parties dures, qui par conséquent ne sont
guère susceptibles d'être comprimées, on n'a de ressource que dans la contre-ouverture, cela
est incontestable (1). quoiqu'il y ait une ouverture naturelle,
quand il se forme un abcès dans l'acrotia, on ne demeureroit réellement efficace
que dans une contre-ouverture pratiquée à la partie la plus basse (m).

Quand les foyers cancerreux qui occupent la circonférence interne de la poitrine,
comme derrière le sternum ou les côtes, il est fort difficile, pour ne pas dire
impossible, de procurer la détersion et la consolidation sans contre-ouverture,
quand même l'ouverture primitive, qui doit toujours être supprimée, fournisset
une issue fort libre à la matière. Cette contre-ouverture se fait quelque fois avec
le bistouri, lorsque la situation du foyer est favorable à l'emploi de cet instrument,
mais dans le plus grand nombre de cas, on est obligé d'emporter une portion d'os, soit

(1) On lit cependant dans une
dissertation de M. Runge, Sur
les maladies des sinus frontaux
et maxillaires, qu'un de ces sinus
dilaté avoit des parois
si minces qu'elles cédent
aisément lorsqu'on les pressoit
avec le doigt. Dans cette
circonstance la compression
auroit pu valoir la peine; mais
la délicatesse des arguments du
village ne permettroit pas
d'employer longtemps ce moyen.

(M) V. le même de M. Bondeur
Sur les maladies des sinus
maxillaires. Acad. R. de chirurgie,
tom. IV.



114

du Sternum soit des côtes, ce qui ne le fait que par l'opération du trépan. L'observation
de M. Durivier, insérée dans le mémoire de M. de la Martinière sur l'opération du trépan
au Sternum, dont le malade qui en fait le sujet a été délivré d'un abcès dans la
poitrine derrière le Sternum, par la simple ouverture de son sommet et par le
moyen de la situation et de la toux qui favorisoit la décharge du foyer, sans qu'on ait
été obligé de recourir à la perforation des côtes, est une exception à la règle générale mais
qu'on doit s'attendre à ne rencontrer que très rarement. Cette observation peut
induire en erreur ceux qui ne la méditeroient pas après et qui ne la rapprocheroient pas
des autres observations qui font la base du savoir-memoire du chef de la chirurgie
française. On lit dans ce mémoire un exemple bien frappant du succès de la
contre-ouverture pratiquée sur le Sternum par le moyen du trépan dans le cas d'un
abcès derrière cet os. par M. Alary chirurgien de l'hôpital Royal de ses écoles; (M)
c'est la 4^e observation de l'ouvrage. M. Desvauxvieux rapporte une observation R.
qui se présente ici sous un jour vraiment intéressant. Il a vu, dit-il, une fistule
dont l'orifice étoit étoit ouvert à la partie antérieure de la côte gauche de la poitrine, et
qui descendoit par un chemin sinueux derrière le cartilage d'une côte; l'on ne pourroit
l'empêcher par aucun moyen que le pus amasse au fond de cette cavité n'y
» demeurât en stagnation; le cartilage de la côte rendoit la compression inutile;
» et l'ouverture du fond de la fistule étoit ~~devenue~~ si on l'eût faite impossible, du
» moins fort dangereuse. Cela a voulu, à la vérité, qu'en pareil cas on coupât la
» côte des deux côtés, et qu'on enlevât le fragment, de peur qu'il ne restât quelque
» corruption au dedans; mais personne, avec je pense, n'osera si aisément se
» retrancher, dans un homme vivant, une portion de côte, l'envie de l'arracher
» de la plexe à laquelle elle a des adhérences assez fortes. Le malade ayant
» éprouvé presque toutes les méthodes sans en retirer aucun fruit, supporta
» patiemment le mal qu'il ne pouvoit éviter et mourut subitement deux ans après ».

(§415)

il est hors de doute que par un traitement méthodique M. Desvauxvieux eût sauvé
la vie à son malade; mais ce qu'il appelle méthode n'étoit, comme le remarque
M. Louis, qu'un traitement varié arbitrairement dans le desir louable de guérir;
mais il n'y a, ajoute le savant traducteur, qu'une seule et unique méthode, qui
doit être suivie avec connoissance de cause; elle étoit fort dans le cas rapporté par
Desvauxvieux à prévenir l'accumulation de la matière dans le fond du sac en lui
donnant issue par une contre-ouverture, et à enlever une portion de la côte si elle
étoit cariée. On ne voit point quel pourroit être le danger que M. Desvauxvieux
redoutoit tant de voir le succès de celle-ci, dont l'opération pourroit sauver la vie
au malade. L'observation de M. Ferrand M^e de chirurgie à Narbonne, rapportée
par M. de la Martinière, prouve l'efficacité, ou plutôt la nécessité de cette méthode.
cette observation montre encore d'une manière évidente la nécessité de la contre-ouverture.

Dès que le foyer qui s'étendait sous les muscles épigastriques au dessous du cartilage
 xyphoïde fut ouvert et le pus évacué, le malade qui sembloit être à l'extrémité
 parut revenu à la vie, et d'après ^{quelques} diminution des accidents amena
 sensiblement la guérison, qui fut longue à la vérité, mais qui fut solide et dont
 la suite est évidemment dû aux soins de M. Ferrand. C'est par une suite des
 principes exposés dans ce paragraphe, qu'on doit ouvrir les dépôts formés derrière les
 os plats, comme l'omoplate, les scapules, ceux même du crâne, dès qu'on a des
 signes suffisants de leur existence, ce qui ne peut se faire communément que par
 la perforation de l'os qui recouvre le foyer, en appliquant une ou plusieurs couronnes
 de trepan. M. Chauvin a fait avec succès une telle ouverture au crâne pour
 donner issue à de la matière granulée à quelque distance de l'ouverture première
 faite par l'opération de trepan, pour une fracture. (n) Un chirurgien après tant de
 fois refusé d'entreprendre une opération non usitée qui peut sauver la vie à un
 malheureux ne mérite pas le nom qu'il porte. Quelle que soit la cause qui
 entretient un ulcère cancreux on ne peut s'opposer de le conduire à une parfaite
 guérison que par la destruction de cette cause; tout chirurgien qui perdrait de
 vue ce principe, agirait sans conséquence et manquera son objet.

Thomaspin, Maître en chirurgie de la ville de Dole, résidant à
 Rochefort en franche comté.

Rochefort, le 17 Dec 1777.



(n) mémoire de l'académie
 R. de l'ist. ^{tom. 1} mem. de M. Guenay
 sur la multiplicité de trepan

